



LES PLEURS DE LA VIGNE

*Le Renouveau
Période : Février - Mars*



L'entrée en activité du système racinaire déclenche un mouvement ascendant de sève. En l'absence de végétation, la sève s'écoule au niveau des plaies de la taille.

Les pleurs sont la première manifestation de la reprise d'activité de la vigne.



Les Pleurs de la vigne

FÉVRIER - MARS

Au début de l'hiver, la vigne entre en repos végétatif et en état de latence. À ce stade la sève descend dans le tronc et les racines, l'homme en profite pour tailler la vigne.

Une fois le travail de la taille achevé, **les plaies laissées par le vigneron ne sont pas cicatrisées.**

La **vigne va pleurer** et les bourgeons vont gonfler. Ces deux phénomènes, vont **annoncer l'arrivée du printemps** et d'un temps plus clément.

Les pleurs que nous allons constater au niveau des plaies de tailles, **indiquent le passage de la vigne d'une vie passive à une vie active.**

Pour cela, il faut que le sol, à une profondeur de 25 centimètres, atteigne une température légèrement supérieure à 10°C. La vigne va ensuite commencer à **puiser de l'eau et va envoyer la sève jusqu'aux extrémités des branches, sur les plaies non cicatrisées, là où le vigneron a marqué la vigne d'un coup de sécateur.**

Durant ce processus, chaque pied peut perdre entre **0,5 et 4 litres de sève**. La perte va varier en fonction du cépage, mais également en fonction du nombre de plaies effectuées lors de la taille.

Le saviez-vous ?

Nous taillons la vigne en biseau. Elle consiste à tailler le brin en sens opposé par rapport au dernier bourgeon (*voir la photo ci-dessous*). Cela permet d'éviter, que les pleurs tombent sur les bourgeons et les humidifient.

Si le gel printanier se manifeste, le bourgeon humide va geler et entrainera la perte de celui-ci. L'humidité apporte également des maladies.

